

## PRINCIPES CONTACT TRACING JEUGDKAMPEN MET OVERNACHTING

- De RMG erkent het belang van het jeugdwerk voor de algemene ontwikkeling en het mentaal welzijn van kinderen en onderschrijft het principe dat de impact van één besmetting op een kamp zo beperkt mogelijk moet blijven.
- Niettemin moet er ook aandacht geschonken worden aan operationele aspecten en moeten voorgestelde procedures haalbaar zijn in de praktijk (bv. testen op locatie).
- **Aangezien jeugdkampen niet beperkt zijn tot één regio, is het uiterst belangrijk dat overal in België dezelfde regels gelden.**
- De RMG dringt er op aan dat de **geldende definities en principes van contact tracing gerespecteerd worden**:
  - Contact tracing wordt gestart bij een bevestigd geval. In afwachting van die bevestiging moet de persoon met vermoeden van COVID in isolatie geplaatst worden maar zijn geen bijkomende maatregelen nodig voor de rest van het kamp.
  - Hoog-risico contacten moeten in quarantaine en moeten getest worden.
  - Quarantaine betekent per definitie dat men zich afzondert van andere personen, **er kan dus geen sprake zijn van “quarantaine ter plaatste”**: hoog-risico contacten moeten het kamp verlaten.
- De impact van één besmetting op kamp zal dus bepaald worden door het aantal hoog-risico contacten dat het indexgeval had.
  - Dit betekent dat als een begeleider of deelnemer positief test op het Coronavirus, en er geen afstand wordt gedragen of afstand wordt gehouden binnen de groep, de hele groep zijn activiteit moet staken. Al deze deelnemers (tot 100 personen) zullen worden beschouwd als hoog-risicocontacten en zullen thuis in quarantaine moeten gaan, zich laten testen en het kamp zal worden stopgezet.  
Door een groep op te splitsen kunnen sommige deelnemers/begeleiders doorgaan als één van hen (volwassenen of kind/jeugd) positief test.
  - Hiertoe adviseert de RMG dat **de organisatoren, die over voldoende infrastructuur en begeleiders beschikken, zoveel mogelijk blijven werken in kleine subgroepen die autonoom en zonder onderling contact handelen.**
  - Hiervoor adviseert de RMG **om kleinere subgroepen af te bakenen**. De leden van een subgroep worden, in analogie met een huishouden, beschouwd als nauwe contacten van elkaar; binnen de subgroep moet geen afstand worden gehouden noch mondkapjes gedragen worden. Bij een besmetting zal de hele subgroep als hoog-risico contact ingedeeld worden terwijl de andere subgroepen het kamp kunnen voortzetten
  - Naar analogie van de reeds bestaande regels voor lagere scholen (waar geen maskers gedragen worden) en definities van hoog-risicocontacten (bv. huishoudcontacten zijn steeds hoog-risicocontacten) zijn personen die samen in dezelfde ruimte slapen en die fysiek contact hebben met elkaar (zoals tijdens spelletjes) in elk geval hoog-risico contacten.
  - Het delen van binnenruimtes door verschillende subgroepen zonder gebruik van mondkapjes wordt zoveel mogelijk vermeden.
  - Verschillende subgroepen kunnen wel samen in dezelfde ruimte eten, op voorwaarde dat er afstand gehouden wordt tussen de subgroepen en dat er gewaakt wordt over goede ventilatie.
  - Verschillende subgroepen kunnen buiten samen bv. rond het kampvuur zitten, op voorwaarde dat er afstand gehouden wordt tussen de verschillende subgroepen.
- Wanneer een subgroep het kampterrein moet verlaten omwille van een besmette persoon, kan het kamp zonder bijkomende maatregelen verdergezet worden door de andere deelnemers, tenzij er vermoed wordt dat de besmettingen zich verspreid hebben buiten de subgroep.

- Wijdverspreide besmettingen worden vermoed wanneer er in de 1<sup>e</sup> testronde van de subgroep een hoog aantal besmettingen (bv. >30% van de geteste kinderen) vastgesteld wordt. Er wordt dan in 1<sup>e</sup> instantie geprobeerd om testing ter plaatse te organiseren zodat het kamp verdergezet kan worden. Indien er tijdens de grootschalige testronde meer dan 1 bijkomende subgroep besmet blijkt te zijn, wordt het kamp stopgezet en worden alle deelnemers beschouwd als hoog-risico contact.
- Indien grootschalige testing logistiek niet haalbaar is, maar er op basis van symptomen een nieuwe besmetting wordt vastgesteld in een andere subgroep, wordt het kamp stopgezet en worden alle deelnemers beschouwd als hoog-risico contact, behalve indien de bron van de bijkomende besmetting duidelijk extern is, bv door familielid net voor het kamp.

N.B. : Deze RMG-aanbeveling is beperkt tot activiteiten met een overnachting. Voor kampen zonder overnachting blijven de procedures voor lagere scholen van toepassing.

Wanneer een kind symptomen vertoont, wordt een evaluatie uitgevoerd door een plaatselijke arts. Kan de evaluatie niet terplekke worden uitgevoerd dan komen de ouders hun kind ophalen. Het kind kan terugkeren naar het kamp op basis van deze medische evaluatie door de arts en onder bepaalde voorwaarden (bv. 24 uur zonder koorts).

Jeugdbewegingen dienen voor elk kamp een covid referent aan te wijzen. Wanneer zich een COVID-geval voordoet, moet die referent een deelnemerslijst aan de cel Infectieziektebestrijding bezorgen. De werkgroep 'testing en tracing' buigt zich verder over de praktische aspecten van de contact tracing.